

# Réanimation du sujet âgé

## Cas cliniques

F.CAUGANT

M.Arlboro, 88 ans, appel pour fausse route, arrivée sur les lieux après 30min.

Patient en ACR, cyanosé, pupilles en mydriase, pas de MCE entrepris par l'équipe soignante

ATCDT: Patient grabataire, dément, vivant en maison de retraite.  
Note dans le dossier: pas de réanimation souhaitée

# Décision?

Mme. Uh, patiente de 60 ans, malaise sur la voie publique alors qu'elle se rendait à la gym

MCE commencé dans la minute par un passant

ATCDT inconnus

# Décision?

& Patient de 73 ans retrouvé en ACR par la famille à 21h suite à une absence de 3h

ATCDT: « tension », « infractus », « cancer de la prostate », 1 PTH Dte

Sur place la petite fille nous demande de tout faire pour son grand père, le fils ne souhaite pas de réanimation pour son père.

# Décision?

- ⌘ Horaire de l'ACR inconnu
- ⌘ Souhais divergents de la famille
- ⌘ ATCDT peu clairs
- ⌘ MT injoignable

# Problèmes

⌘ Patient de 85 ans, chute avec PC.

Les pompiers arrivent les premiers sur place après 10 min, MCE débuté.

A notre arrivée 15min de MCE sans reprise de l'activité cardiaque.

ATCDT: IDM (4 stents), HTA, Leucémie

Femme en état de choc psychologique

# Décision?

- ⌘ Réanimation débutée
- ⌘ ATCDT « non décisifs »
- ⌘ Pas d'information sur les souhaits de la famille

# Problèmes

⌘ Patient de 75 ans, ACR, appelle de la famille.

Arrivé dans le camp des gens du voyage après 15min.

Rigidité cadavérique, pas de MCE débuté par la famille.

# Décision?



- ⌘ Pression familiale
- ⌘ Lieu. mise en danger de l'équipe.

# Problème

⌘ Patiente de 90 ans, ACR suite fausse route, Heimlich inefficace, mise en PLS

Arrivée rapide sur les lieux.

Patiente cachectique, déplacement en fauteuil roulant exclusivement; troubles cognitifs modérés .

Pas d'information dans le dossier sur les souhaits de la patiente ou de la famille

# Décision?

⌘ Etat limite

⌘ Absence d'information sur les souhaits de la patiente ou de la famille

- Intervalle estimé sans réanimation
- Etat antérieur du patient
- Souhait du patient/famille
- Evaluation du soignant
- Réa engagée

# Facteurs décisionnels

- ⌘ Différence entre la vision de santé patient/médecin
- ⌘ Pression familiale
- ⌘ Lieu de l'ACR
- ⌘ Pression des services de réanimation

# Biais

Intérêt +++ des souhaits du patient

Date	Décision réanimation	Patient/Famille Signature	Médecin Signature

exemple