



**Prise en charge
des syndromes coronariens aigus
dans le Haut-Rhin**

Dr Pincemaille Sophie

Assistante spécialiste

SAU

Hôpitaux Civils de Colmar

Dans le territoire de Mulhouse

- Deux structures d'accueil des SCA :
 - Hôpital Emile Muller
 - Clinique du Diaconat
- Ces deux structures sont pourvues :
 - USIC
 - Salles de Coronarographie
- Unité de douleur thoracique au sein des USIC du CHEM
- 2 SMUR

SCA ST + : hors thrombolyse

- 1ere anti-agrégation plaquettaire :
 - Aspegic 250 mg

SCA ST + : hors thrombolyse

- 2nd anti-agrégation plaquettaire :
 - **Efient 60 mg soit 6 comprimés de 10 mg**
 - Si contre indication à Efient :
 - AVC
 - Traitement en cours : Anticoagulation/Plavix/ Brilique
 - Age supérieur à 75 ans
 - Poids inférieur à 60 Kg
 - = **Brilique 180 mg soit 2 cp de 90 mg**
 - Si contre indication au Brilique :
 - Hémorragie active
 - ATCD d'hémorragie intracrânienne
 - Insuffisance hépatique sévère
 - Traitement VIH et antifongique
 - = **Plavix 600 mg soit 2 cp de 300mg**

SCA ST + : hors thrombolyse

- Anticoagulation :
 - 1ere intention : Angiox

Poids	Bolus	PSE	Poids	Bolus	PSE	Poids	Bolus	PSE
60	45mg 9cc	21cc/h	80	60mg 12cc	28cc/h	100	75mg 15cc	35cc/h
65	49mg 9,75cc	23cc/h	85	64mg 12,75cc	30cc/h	105	78,75mg 15,75cc	36,7cc/h
70	52,5mg 10,5cc	24,5cc/h	90	67,5mg 13,5cc	31,5cc/h	110	82,5mg 16,5cc	38,5cc/h
75	56,2mg 11,25cc	25,6cc/h	95	71,25mg 14,25cc	33,2cc/h	115	86,25mg 17,25cc	40,2cc/h

- 2 intention si contre indication Angiox : insuffisance rénale dialysé
= HNF (bolus de 60 UI/kg)

Poids	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Dose	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000

SCA non ST+

- SCA non ST+ menaçant ou non évolutif sans modification ECG ou doute sur une autre pathologie
 - Aspegic 250 mg
- SCA non ST+ menaçant ET évolutif avec modification ECG et sans doute sur une autre pathologie
 - Aspegic 250 mg
 - Appel du cardiologue pour la seconde anti-agrégation

Dans le territoire de Colmar :

- Deux structures prenant en charge les SCA :
 - Hôpitaux Civils de Colmar
 - Hôpital Albert Schweitzer
- Ces deux structures sont pourvues :
 - USIC
 - Salles de Coronarographie
- Pas d'Unité de Douleur Thoracique au HCC
- Urgences cardiologiques à l'hôpital Schweitzer
- 2 SMUR

Protocole SCA ST+

- Aspegic 250 mg en IV
- Brilique : deux comprimés per os soit 180 mg
 - En cas de contre-indication Plavix 600mg
- Lovenox : sauf si âge supérieur à 75 ans
 - 0,3 mg en IV
 - 0,1 mg/10kg en sous cutané
 - Soit pour un patient de 60 kg : 0,3 mg en IV et 0,6 mg en SC

Pas de protocole pour le SCA non ST+

- Mise sous Aspegic 250 mg en IV
- Autres anti-agrégations laissées au choix du cardiologue après transfert

Limite de ce protocole :

- Pas de consensus pour tous les cardiologues
- Non valable si patients sous AVK ou AOD
- En cas d'arrêt cardiaque récupéré avec SCA ST + :
 - Mise sous Brilique par une sonde naso-gastrique ?
 - Disponibilité début 2018 de Brilique en orodispersible
- Pas de thrombolyse